


うつ病・うつ状態で デュロキセチンカプセル「KMP」を 服用される患者さまとご家族の方へ

少量からはじめ、徐々に増やしていきます

デュロキセチンカプセル「KMP」の治療では、少量からはじめて、お薬の効果や副作用の状態をみながら、徐々に飲む量を増やしていきます。



効果があらわれるまでに少し時間がかかります

効果があらわれるまでに2～4週間かかる場合もあります。すぐに効果があらわれなくても心配したり、不安にならず、継続して飲んでください。

医師または薬剤師の連絡先

服用するときの注意点

- 眠気、めまいなど、自動車の運転に影響を与える症状があらわれることがあるので、注意してください。またこれらの体調不良を自覚した場合は、絶対に運転しないでください。特に薬の飲みはじめ、飲む量を変えたとき、他の薬から変えた際にこれらの症状があらわれやすいため、医師より運転などをしないように指示があった場合は指示を守りましょう。
- 体調がよくなったと自己判断して服用を中止したり、量を減らしたりすると、些細なことでも心配になる、いらいらする、あせるなどの症状があらわれることがあります。医師の指示どおりにきちんと飲み続けてください。
- このお薬を飲んでいる間、特に飲みはじめや飲む量を変えたときに、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪化することがあります。このような症状があらわれた場合は、医師に相談してください。
- 不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができないなどの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合は、医師に相談してください。



※ カプセルをあけたりせず、そのまま飲んでください。

ご家族の方へ

ご家族の方は、「死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来す」などの患者さまの行動の変化や、うつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する危険性について、医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さまの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。

18歳未満の患者さまの服用に関する注意

7～17歳のうつ病の患者さまがこのお薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。18歳未満のうつ病の患者さまやそのご家族の方は、医師と十分に相談してください。

**ほかにも気になることや、わからないことがある場合は
医師または薬剤師に相談してください。**