ロキソプロフェンNaテープ「FFP」を使用される患者さまへ

貼り方

① フィルムの中央部分をはがします。



② はがした薬面を患部の中心に貼ります。



③ 片方のフィルムをはがして貼ります。



④ もう片方のフィルムをはがして貼り、全体をしっかりと押さえます。



貼るときの注意

- 患部を清潔にして、汗でぬれている場合は、よく拭きとってから使用してください。
- 傷口、粘膜、湿疹または発疹のある部位には使用しないでください。
- 入浴する際は、本剤をはがしてからお入りください。
- 続けて貼る場合は、かぶれを防ぐために少し時間をあけて、皮膚を休ませてから貼ってください。

注 意

**医師・薬剤師の指導のもと、
下記の事項に注意して使用してください。**

- 本剤の成分で過敏症を起こしたことのある方、アスピリンぜんそくのある方または起こしたことのある方は使用しないでください。
- 気管支ぜんそくのある方は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
- かゆみ、発疹・発赤、かぶれ、胃不快感などの症状があらわれた場合には、使用を中止して医師または薬剤師に相談してください。

保管上の注意

- 開封後はファスナー部をしっかり合わせて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけて保管してください。

医師または薬剤師の連絡先

共創未来ファーマ株式会社

A000004702
2022年10月作成