



オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」

| | 後発医薬品 | 先発・代表薬剤 |
|--------|---|--|
| 会社名 | 東和薬品株式会社＝共創未来ファーマ株式会社 | |
| 販売名 | オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」 | オルメテックOD錠10mg |
| 一般名 | オルメサルタン メドキシミル | |
| 薬効分類名 | 高親和性AT ₁ レセプターブロッカー | |
| 規格 | 1錠中の有効成分： 日局 オルメサルタン メドキシミル……10mg | |
| 薬価 | 20.40 | 54.50 |
| 添加物 | 乳糖水和物, D-マンニトール, 軽質無水ケイ酸, 酸化チタン, ヒドロキシプロピルセルロース, アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物), 香料, その他4成分 | 結晶セルロース, β-シクロデキストリン, カルメロース, スクラロース, アセスルファミカリウム, ステアリン酸マグネシウム, 香料 |
| 効能効果 | 高血圧症 | |
| 用法用量 | 通常, 成人にはオルメサルタン メドキシミルとして10~20mgを1日1回経口投与する。なお, 1日5~10mgから投与を開始し, 年齢, 症状により適宜増減するが, 1日最大投与量は40mgまでとする。 | |
| 製剤特性性状 | 口腔内崩壊錠, 白色の割線入りの口腔内崩壊錠 | 口腔内崩壊錠, 白色~微黄白色・素錠(口腔内崩壊錠)・割線入 |
| 本体表示 | 表:オルメ 10, 裏:オルメサルタン 10 OD トーフ | |
| 形状 | 錠径:6.5mm, 厚さ:3.1mm, 質量:112mg | 直径:6.1mm, 厚さ:約3.0mm, 重さ:約80mg |
| 品質情報 | <p style="text-align: center;">溶出試験</p> <p>試験製剤:オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」 標準製剤:オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」</p>  <p style="text-align: center;">「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき, 両剤の溶出挙動が等しく, 生物学的に同等であるとみなされた。</p> | <p style="text-align: center;">血中濃度</p> <p>(参考)オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」 水なしで服用(標準製剤は水で服用) [標準製剤:普通錠]</p>  <p>後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い, 両剤の生物学的同等性が確認された。</p> |
| 連絡先 | | |