



# オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」

	後発医薬品	先発・代表薬剤
会社名	東和薬品株式会社＝共創未来ファーマ株式会社	
販売名	オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	オルメテックOD錠20mg
一般名	オルメサルタン メドキシミル	
薬効分類名	高親和性AT <sub>1</sub> レセプターブロッカー	
規格	1錠中の有効成分： 日局 オルメサルタン メドキシミル……20mg	
薬価	39.00	103.40
添加物	乳糖水和物, D-マンニトール, 軽質無水ケイ酸, 酸化チタン, ヒドロキシプロピルセルロース, アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物), 香料, その他4成分	結晶セルロース, β-シクロデキストリン, カルメロース, スクラロース, アセスルファミカリウム, ステアリン酸マグネシウム, 香料
効能効果	高血圧症	
用法用量	通常, 成人にはオルメサルタン メドキシミルとして10~20mgを1日1回経口投与する。なお, 1日5~10mgから投与を開始し, 年齢, 症状により適宜増減するが, 1日最大投与量は40mgまでとする。	
製剤特性性状	口腔内崩壊錠, 白色の割線入りの口腔内崩壊錠	口腔内崩壊錠, 白色~微黄白色・素錠(口腔内崩壊錠)・割線入
本体表示	表:オルメ 20, 裏:オルメサルタン 20 OD トーフ	
形状	錠径:8.0mm, 厚さ:3.4mm, 質量:180mg	直径:7.6mm, 厚さ:約3.8mm, 重さ:約160mg
品質情報	<b>溶出試験</b>	<b>血中濃度</b>
	<p style="text-align: center;">pH6.8, 50rpm, バドル法</p>  <p style="text-align: center;">後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い, 自社製剤と標準剤の溶出挙動は上記条件において類似していると判定された。</p>	<p style="text-align: center;">水なしで服用(標準製剤は水で服用) [標準製剤:普通錠]</p>  <p style="text-align: center;">後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い, 両剤の生物学的同等性が確認された。</p>
連絡先		