





製品別対比表(類似品との対比)(案)

	後 発 品	類 似 品			
会 社 名	(株)陽進堂=共創未来ファーマ(株)				
商 品 名	ピタバスタチンCa錠4mg「YD」	リバロ錠4mg			
薬 価	72.90円/1錠	185.70円/1錠			
薬 価 差	112.80円/1錠				
規 格	1錠中、ピタバスタチンカルシウム水和物4.4mg(ピタバスタチンカルシウムとして4mg)を含有する。				
薬 効 分 類	HMG-CoA還元酵素阻害剤				
効 能 ・ 効 果	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症				
用 法 ・ 用 量	通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。				
添 加 物	D-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウ	乳糖水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、クエン酸トリエチル、含水二酸化ケイ素、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色五号、黄色三二酸化鉄			
製 品 の 性 状		重量 (mg)	直径 (mm)	厚さ (mm)	コード(PTP)
	ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 白色のフィルムコーティング錠である。	240 	約8.6 	約4.1 	YD 215
品 質 再 評 価	該当しない				
標準品との同等性	溶出試験(試験液:水)、標準品:ピタバスタチンCa錠2mg「YD」  「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日薬食審査発第100229号)」に基づき両製剤の溶出挙動は同等であると判断された。				
備 考					
連絡先					