

# ロピニロール徐放錠2mg/8mg「KMP」

を服用される患者さまとご家族の方へ

このお薬を正しく服用するため、飲む前に  
必ずお読みください。



このお薬を飲むと、眠くなったり、  
前ぶれもなく急に眠り込んでしまうこと  
がありますとっばつてきすいみん(突発的睡眠)。

自動車の運転、危険を伴う  
機械の操作、高いところでの  
作業などは避けてください



とっばつてきすいみん  
突発的睡眠について

食事中や会話の最中などにも急に眠り込んでしまう  
ことがあります。また、このような症状は、薬を飲み始  
めて1年以上経過してから見られる場合もあります。



社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、  
欲求や行動を抑えることが難しくなる、  
しょうどうせいぎょしょうがい  
『衝動制御障害(病的賭博、強迫性購買、  
病的性欲亢進、暴食など)』が  
起こることがあります。



## その他の注意点

- できるだけ毎日同じ時間帯に飲んでください。
- 必ず医師の指示に従って服用してください。自分の判断で飲む量を変えたり、服用を中止したりしないでください。
- このお薬はゆっくり溶けだし、長時間作用します。割ったり砕いたりせず、そのまま噛まずに飲んでください。
- 便の中にこのお薬が見つかった場合は、十分な効果が得られないことがありますので、医師または薬剤師に相談してください。

次のような症状があらわれたときは、すぐに  
医師または薬剤師に相談してください。

- ◎ 急な眠り込み、ひどい眠気
- ◎ 幻覚、妄想
- ◎ 衝動制御障害
- ◎ 発熱、意識がぼんやりする
- ◎ めまい、ふらつき
- ◎ 筋肉がひどくこわばる

ほかにも気になることや、わからないことがある場合は  
医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の連絡先