

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠

**フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg [FFP]**

**フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg [FFP]**

Fexofenadine Hydrochloride Tablets 30mg・60mg[FFP]

アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠

**フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg [FFP]**

Fexofenadine Hydrochloride OD Tablets 60mg[FFP]

2024年5月

製造販売元 共創未来ファーマ株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、本文書の内容にご留意下さいますようお願い申し上げます。  
今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の医薬品安全対策情報（DSU）No. 326  
（2024年5月発行）に掲載される予定です。

記

### 1. 改訂内容（改訂部分抜粋、\_\_\_\_\_（下線）部は追加・改訂箇所）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）			10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エリスロマイシン[16.7.1、17.3.2 参照]	本剤の血漿中濃度を上昇させるとの報告がある。	P糖蛋白の阻害による本剤のクリアランスの低下及び吸収率の増加に起因するものと推定される。	エリスロマイシン[16.7.1、17.3.2 参照]	本剤の血漿中濃度を上昇させるとの報告がある。	P糖蛋白の阻害による本剤のクリアランスの低下及び吸収率の増加に起因するものと推定される。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤[16.7.2 参照]	本剤の作用を減弱させることがあるので、同時に服用させないなど慎重に投与すること。	水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。	水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤[16.7.2 参照]	本剤の作用を減弱させることがあるので、同時に服用させないなど慎重に投与すること。	水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。
アパルタミド	本剤の血漿中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。	P糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。			



## 2. 改訂理由

先発医薬品の自主改訂に伴い、同様の改訂を行いました。


最新の電子化された添付文書は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」(<https://www.pmda.go.jp>) 並びに弊社ホームページ (<https://www.kyosomirai-p.co.jp/>) でご参照いただけます。

また、以下のGS1コードを、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で読み取ることでもご確認いただけます。

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg/60mg「FFP」

フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「FFP」



製造販売元  
 **共創未来ファーマ株式会社**  
東京都品川区広町 1-4-4

### 【お問い合わせ先】

共創未来ファーマ株式会社 お客様相談室  
〒155-8655 東京都世田谷区代沢 5-2-1  
TEL 050-3383-3846